



## CANESTEN

### **Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

Detta läkemedel är receptfritt. Canesten måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till din farmaceut om du behöver mera information eller råd.
- Du måste uppsöka läkare om symptomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar.

#### I denna bipacksedel finner du information om:

1. VAD CANESTEN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. Innan du använder CANESTEN
3. Hur du använder CANESTEN
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av CANESTEN
6. Övriga upplysningar

#### **Canesten 100 mg vaginaltablett**

#### **Canesten 500 mg vaginaltablett**

#### **Canesten 500 mg vaginaltablett + 1% kräm**

*100 mg eller 500 mg vaginaltabletter:* Det aktiva innehållsämnet är klotrimazol. 1 vaginaltablett innehåller 100 mg eller 500 mg klotrimazol.

Övriga innehållsämnen är kalciumlaktatpentahydrat, krospovidon, vattenfri kolloidal kiseldioxid, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, mjölksyra.

*1 % kräm:* Det aktiva innehållsämnet är klotrimazol. 1 g kräm innehåller 10 mg klotrimazol.

Övriga innehållsämnen är sorbitanstearat, polysorbat, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, oktyldodekanol, bensylalkohol, vatten.

#### **Innehavare av godkännande för försäljning**

Bayer AB  
Box 606  
SE-169 26 Solna



## Tillverkare

Bayer HealthCare AG  
D-51368 Leverkusen  
Tyskland

Eller

Kern Pharma SL  
E-08228 Terrassa (Barcelona)  
Spanien

## 1. VAD CANESTEN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Klotrimazol är ett svampdödande medel, som har effekt mot olika typer av mikroorganismer, såsom dermatofyter (svamp i huden), jästsvampar och mögelsvampar.

Canesten används för behandling av infektioner i slidan och yttre könsorganen orsakade av mikroorganismer känsliga för klotrimazol. Infektionerna är vanligtvis orsakade av *Candida* (jästsvampar). Symtomen kan vara klåda, en brännande känsla och vit till gul flytning.

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

## 2. INNAN DU ANVÄNDER CANESTEN

### Använd inte CANESTEN:

- om du är överkänslig (allergisk) mot klotrimazol eller mot något av övriga innehållsämnen i Canesten.

### Var särskilt försiktig med CANESTEN

Behandling skall inte påbörjas utan att kontakta läkare

- om det är första gången du fått en infektion i underlivet,
- om du haft återkommande infektioner under en lång period, för att utesluta andra bakomliggande sjukdomar som i sin tur orsakar svampinfektioner,
- om du är under 15 år eller i klimakteriet, för att utesluta andra sjukdomar,
- om du har illaluktande flytning, då den kan vara orsakad av annan sjukdom än svampinfektioner.

Behandlingen med Canesten vid infektioner i underlivet kan minska effekten och säkerheten hos produkter som kondom och pessar. Effektivitetsminskningen är tillfällig och kvarstår bara så länge behandlingen pågår.

Sexuell partner bör behandlas endast om symtom visar sig och efter kontakt med läkare.



## Graviditet

Canesten kan användas, men vaginalkräm bör undvikas. Under graviditet är vaginaltabletter att föredra, eftersom de kan föras in med fingrarna utan att använda applikator. Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du tar något läkemedel.

## Amning

Canesten kan användas.  
Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du tar något läkemedel.

## Körförmåga och användning av maskiner

Läkemedlet påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

## Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i CANESTEN

Canesten kräm innehåller hjälpämnet cetostearylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

## Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

## 3. HUR DU ANVÄNDER CANESTEN

### Dosering:

Canesten 100 mg vaginaltabletter: 1 vaginaltablett införes i slidan varje kväll i 6 dagar. Behandlingen skall fullföljas även om symtomen försvunnit.

Canesten 500 mg vaginaltabletter: 1 vaginaltablett införes i slidan som engångsdos på kvällen.

Vaginaltablettens skall införas i slidan så djupt som möjligt. Behandlingen bör ske på kvällen strax före sänggåendet och utförs bäst i ryggläge med lätt uppdragna ben.

Av praktiska skäl skall behandling inte ske under menstruation.

De angripna områdena innefattar vanligtvis både slidan och de yttre könsorganen. De yttre könsorganen skall behandlas med Canesten 1 % kräm (eller 1 % vaginalkräm) som stryks på tunt 2–3 gånger dagligen tills 3 dagar efter att besvären försvunnit.

Kontakta läkare om dina symtom blir värre eller om du inte blivit bättre efter 3 dagar. Använd alltid Canesten enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker.


Canesten vaginaltabletter och kräm är luktlösa och missfärgar inte underkläderna.



## Bruksanvisning:

*100 mg, 500 mg vaginaltabletter:*

1. Tryck lätt på applikatorns mynning (B) så att vaginaltablettens passas. (Spetsen på vaginaltablettens placeras utåt).
2. Applikatorn (B) föres så djupt som möjligt upp i slidan. Detta görs bäst om man ligger på rygg med lätt uppdragna ben.
3. För in kolven (A) i hela dess längd. Drag därefter ut applikatorn med kolven intryckt.
4. Endast vaginaltabletter 100 mg: Efter användning utdrages kolven (A) ur applikatorn. Delarna tvättas i varmt (ej kokande) tvålsvatten, sköljes i rinnande vatten och torkas omsorgsfullt.



*Applicering av vaginaltabletter utan att använda applikator:*

Vaginaltablettens appliceras i slidan med fingrarna.

## Om du använder mera CANESTEN än du borde

Om du använt för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112 eller 08-331231).

## 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Canesten ha biverkningar.

*Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):* Hudreaktioner som klåda, utslag, sveda eller rodnad.

*Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):* Allergiska reaktioner.

Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut.



## **5. FÖRVARING AV CANESTEN**

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

## **6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.

Bayer AB  
Box 606  
169 26 Solna  
Tel: 08-580 223 00

**Denna bipacksedel godkändes senast den 2008-02-01**